

LA PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

Quels sont les facteurs de risque ?

HPV ++
(Papillomavirus humain)

Mode de vie
Rapports sexuels à un âge précoce
Partenaires multiples
Multiparité

Génétique
Peutz-Jeghers (STK11)

Immunité
Immunodépression acquise / greffe
Tabac
Co-infection IST

Quand et comment se faire dépister ?

■ À partir de **25 ans**✓ **Frottis Cervico-Uterin (FCU)**

2 FCU normaux à 1 an d'intervalle puis tous les 3 ans

■ À partir de **30 ans jusqu'à 65 ans**✓ **Test HPV**

1er test à réaliser 3 ans après le dernier FCU

Comment prévenir ?

■ **Vaccination anti-HPV****Les Recommandations françaises :**

- ✓ Les **jeunes filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans** révolus
- ✓ **Rattrapage vaccinal** pour les deux sexes entre **15 et 19 ans** révolus
- ✓ **Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH)** jusqu'à l'âge de 26 ans
- ✓ Les **patients immunodéprimés** aux mêmes âges que dans la population générale, avec un rattrapage jusqu'à l'âge de 19 ans révolus.
- ✓ Les **enfants des deux sexes**, candidats à une transplantation d'organe solide, la vaccination peut être initiée dès l'âge de 9 ans.